


# Der Weißstorch

(*Ciconia ciconia*)

- **Ankunft in der Brutheimat (Europa):**  
Ende März / Anfang April
- **Abflug ins Winterquartier (Afrika):**  
Jungstörche - Mitte August / Altstörche -  
Ende August
- **Gelege:** 2 - 5 Eier
- **Brutdauer:** 30 - 32 Tage
- **Jungenzahl:** bis 5
- **Zugrouten:**  
Auf zwei Routen ziehen die Störche ab August in ihre Winterquartiere. Dabei unterscheidet man nach Ostziehern und Westziehern.  
Die *Ostzieher* (dazu gehören "unsere" Weißstörche) fliegen zum Balkan, Bosphorus, nach Israel, der Türkei der Halbinsel Sinai oder entlang des Nil bis Südafrika.  
Die *Westzieher* ziehen nach Frankreich, Spanien, Gibraltar, Nord- und Westafrika.  
Dabei sind gewaltige Strecken zu bewältigen. So dauert die Reise nach Südafrika acht bis 15 Wochen mit Tagesetappen von 150-300 km.  
Ende März bis Anfang April kehren die Störche dann wieder in ihre Brutheimat zurück.
- **Nahrungsgrundlage:** Der Weißstorch steht an der Spitze einer Nahrungspyramide. Er selbst hat in seiner Brutheimat keine direkten Feinde. Geschwächte Störche können jedoch Fuchs oder Marder zum Opfer fallen. Die Nahrung selbst besteht aus Regenwürmern, Insekten, kleinen Nage- und Säugetieren bis Rattengröße (hauptsächlich Mäuse), Amphibien (Frösche, Molche), Reptilien (Schlangen, Eidechsen) und Fischen.



Quelle: [www.storchennest.de](http://www.storchennest.de)

# Der Schwarzstorch

(*Ciconia nigra*)

*Größe: 95-100 cm;*

*Flügelspannweite: 185-205 cm*

*Gewicht: +/- 3 kg*

*Kennzeichen:* *adult: glänzend schwarz mit weißem Bauch, roter Schnabel und rote Beine;*  
*juvenil: farblos - v. a. Schnabel und Beine*

*Nahrung:* *Kleinsäuger, Reptilien, Schalentiere, Fische, Insekten, ...*

*Lebensraum:* *Waldbewohner - alte, ruhige Wälder; Nest auf großem Baum - häufig an einer etwas offeneren Stelle im Wald (einfacherer Anflug) - Jagdgebiet liegt an Flüssen u. Bächen, Feuchtwiesen,... Habitat einige km um den Horst; höchste Populationsdichte in Osteuropa mit bis zu 8 Paaren/100 km<sup>2</sup>*


*Nest:* *großer Horst bis 1,5 m Durchmesser auf einem starken Ast oder einer Astgabel eines großen Baumes (meist Eiche oder Buche) in 12 - 25 m Höhe*

*Fortpflanzung:* *monogam - 2 bis 5 Eier, eine Brut im Jahr, 35 bis 38 Tage Brut durch beide Geschlechter, die Jungen sind 63 bis 71 Tage im Nest - dann 1 bis 2 Wochen rund um den Horst, Geschlechtsreife mit 3 Jahren, Höchstalter ist nicht genau bekannt, vermutlich mehr als 20 Jahre*

*Verbreitung:* *Ost- und Südosteuropa - breitet sich in den letzten Jahrzehnten wieder nach Westeuropa aus; viel seltener als Weißstorch - 2600 bis 3000 Paare in Europa, davon nur 250 bis 300 (10 %) in der EU*

*Gefahren:* *Brutstörung durch den Menschen (Wanderer, Forstarbeiten,...) - Nestverlust durch Schlägerung des Horstbaumes; Lebensraumverlust durch Fichtenaufforstungen in nassen Bereichen und von Feuchtwiesen; Wasserverschmutzung*

*Schutz:* *EU-Vogelschutzrichtlinie, Berner Konvention, Washingtoner Artenschutzabkommen*



Quelle: [www.explorado.org/solon-new/intro/introen/id.htm](http://www.explorado.org/solon-new/intro/introen/id.htm)